

FICHA TÉCNICA HISTOVACUNA CONTRA LA PAPILOMATOSIS BOVINA

COMPOSICIÓN:

Suspensión de papilomas molidos y homogenizados	70%
Excipientes	30%

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de la papilomatosis en bovinos.

DOSIS:

Inyecte una dosis de 5 mL cada 8 días durante cuatro semanas

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea

ALMACENAMIENTO:

- Consérvese entre tres y siete grados centígrados
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Uso veterinario
- Venta bajo la fórmula del médico veterinario
- Consulte al médico veterinario

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

Utilícese únicamente en bovinos.

Agitar el producto antes de su uso para asegurar la homogeneidad del contenido

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 20 y 50 mL

FICHA TÉCNICA HISTOVACUNA CONTRA LA PAPILOMATOSIS BOVINA

REGISTRO SANITARIO EN COLOMBIA

La histovacuna contra la papilomatosis bovina de Laboratorios Probiol cuenta con la licencia de venta No. 3.556 -DB del 30 de agosto de 1993 con una vigencia indefinida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ANÁLISIS FÍSICO

HERMETICIDAD DEL CIERRE	Hermético
VOLUMEN DE LLENADO	Mínimo el contenido etiquetado

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

ESTÉRILIDAD	Estéril
-------------	---------